

Renavit®

Gebruiksaanwijzing

Renavit® omhulde tabletten

Gelieve deze bijsluiter aandachtig te lezen, hij bevat belangrijke informatie over het gebruik van dit middel.

- Bewaar deze bijsluiter. Het is mogelijk dat u hem later opnieuw moet lezen.
- Als u nog vragen hebt, stel ze aan uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Renavit® en waarvoor wordt dit middel gebruikt
2. Voordat u Renavit® gaat gebruiken
3. Hoe Renavit® gebruiken
4. Mogelijke nevenwerkingen
5. Hoe Renavit® bewaren
6. Overige informatie

1. WAT IS RENAVIT® EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT

Voeding voor medisch gebruik

Dieetvoeding voor de aanvulling van in water oplosbare vitaminen bij dialysepatiënten.

2. VOORDAT U RENAVIT® GAAT GEBRUIKEN

Neem geen Renavit® als u allergisch (overgevoelig) bent voor één van de ingrediënten van Renavit®. (Zie ingrediëntenlijst in punt 6. Overige informatie)

3. HOE RENAVIT® GEBRUIKEN

Dosering

Gebruik Renavit® steeds precies zoals uw arts het u heeft uitgelegd. Bij twijfel, vraag het aan uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosis is één tablet per dag. Slik de tablet in zijn geheel door (niet kauwen) met een beetje vloeistof.

Wat als u meer Renavit® ingenomen hebt dan aanbevolen

Vraag advies aan uw arts of apotheker.

Wat als u vergeten bent Renavit® in te nemen

U kunt de dosis later op dezelfde dag innemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

4. MOGELIJKE NEVENWERKINGEN

Er zijn over het algemeen geen ongewenste neveneffecten gekend na de inname van Renavit®. Mocht u alsnog onverwachte effecten ondervinden, stop dan met het innemen van de tabletten en vertel het aan uw arts of apotheker.

5. HOE RENAVIT® BEWAREN

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren op een droge plaats, beschermd tegen licht en niet boven kamertemperatuur (25 °C). Gebruik Renavit® niet meer na de houdbaarheidsdatum, steeds vermeld op de doos en gedrukt op de witte zijde van elke blister met tabletten. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

6. OVERIGE INFORMATIE

De inhoud van Renavit®

Hoeveelheid vitaminen per tablet:

Vitamine C	120,0 mg
Thiamine	2,2 mg
Riboflavine	1,7 mg
Niacine	20,0 mg NE
Vitamine B6	10,0 mg
Foliumzuur	1000,0 µg
Vitamine B12	6,0 µg
Biotine	60,0 µg
Pantotheenzuur	7,5 mg

Ingrediënten:

Vitamine C; Antiklontermiddel: Talk; Suiker; Stabilisator: Hydroxypropylmethylcellulose; Vulstof: Cellulose; Nicotinamide; Vitamine B6; Zetmeel; Pantotheenzuur; Kleurstof: Calciumcarbonaat; Palmpitvet volledig gehydrogeneerd; Stabilisator: Arabische gom; Thiamine; Riboflavine; Foliumzuur; Biotine; Vitamine B12; Antiklontermiddel: Siliciumdioxide, Magnesiumzouten van vetzuren; Kleurstoffen: Bietenrood, Kleurstof van safloor en citroenconcentraat; Isomalt; Glansmiddelen: Hydroxypropylcellulose, Glucoestroop; Rijstzetmeel; Eetbare vetzuren; Middellange keten triglyceriden.

Dialysepatiënten

Dialysepatiënten kunnen regelmatig een aanvulling van in water oplosbare vitaminen nodig hebben om volgende redenen:

- Ze vertonen vaak een verminderde aanvoer van in water oplosbare vitaminen. Redenen hiervoor zijn onder andere kalium-gerelateerde dieetbeperkingen (fruit, groenten), maar ook een ernstig vitamineverlies bij het bereiden van de maaltijden (bijvoorbeeld door het weken van kaliumrijk voedsel).
- Tijdens de dialysebehandeling gaan grote hoeveelheden in water oplosbare vitaminen verloren.
- De behoefte aan vitaminen neemt toe als gevolg van een sterk belaste stofwisseling.

Belangrijk advies

Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. Niet geschikt als enige voedingsbron. Buiten het bereik van kinderen bewaren. De aanbevolen dosis niet overschrijden

Als u nog vragen hebt over het gebruik van dit product, stel ze aan uw arts of uw apotheker.

Datum laatste herziening van deze tekst: Augustus 2024

Kuracilo bv
9070 Heusden
België

Fabrikant:
RenaCare NephroMed GmbH
35625 Hüttenberg
Duitsland

Renavit®

Notice d'utilisation

Renavit® comprimés enrobés

Veillez lire attentivement cette notice, elle contient des informations importantes sur l'utilisation de ce produit.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez des questions, adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien.

Contenu de cette notice:

1. Qu'est-ce que Renavit® et dans quels cas ce produit est-il utilisé ?
2. À savoir avant d'utiliser Renavit®
3. Comment prendre Renavit®
4. Les effets secondaires éventuels
5. Comment conserver Renavit®
6. Autres informations

1. QU'EST-CE QUE RENAVIT® ET DANS QUELS CAS CE PRODUIT EST-IL UTILISÉ ? Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales

Aliment diététique pour la supplémentation en vitamines hydrosolubles chez les patients dialysés.

2. À SAVOIR AVANT D'UTILISER RENAVIT®

Ne prenez pas Renavit® si vous êtes allergique (hypersensible) à l'un des ingrédients de Renavit®. (Voir la liste des ingrédients au point 6, Autres informations)

3. COMMENT PRENDRE RENAVIT®

Posologie

Utilisez toujours Renavit® exactement comme votre médecin vous l'a expliqué. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien. La dose recommandée est d'un comprimé par jour. Avalez le comprimé dans son intégralité (ne pas mâcher) avec un peu de liquide.

Que faire si vous avez pris plus de Renavit® que la dose recommandée ?

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que faire si vous avez oublié de prendre Renavit® ?

Vous pouvez prendre la dose plus tard le même jour. Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

4. LES EFFETS SECONDAIRES ÉVENTUELS

En général, aucun effet secondaire indésirable n'est connu après la prise de Renavit®. Cependant, si vous éprouvez des effets indésirables, cessez de prendre les comprimés et parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER RENAVIT®

Garder hors de la portée et de la vue des enfants. Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et à température ambiante (25 °C).

Ne pas utiliser Renavit® après la date de péremption, toujours indiquée sur l'emballage et imprimée sur le côté blanc de chaque plaquette thermoformée comprenant les comprimés.

La date de péremption se réfère au dernier jour du mois indiqué.

6. AUTRES INFORMATION

Le contenu de Renavit®

Quantité de vitamines par comprimé :

Vitamine C	120,0 mg
Thiamine	2,2 mg
Riboflavine	1,7 mg
Niacine	20,0 mg NE
Vitamine B6	10,0 mg
Foliumzuur	1000,0 µg
Vitamine B12	6,0 µg
Biotine	60,0 µg
Pantotheenzuur	7,5 mg

Ingrédients :

Vitamine C; Anti-agglomérant : Talc; Sucre; Stabilisant : Hydroxypropylmethylcellulose; Agent de remplissage : Cellulose; Nicotinamide; Vitamine B6; Amidon ;Acide pantothénique; Colorant : Carbonate de calcium; Graisse de palmitate entièrement hydrogénée; Stabilisateur : Gomme arabique; Thiamine; Riboflavine; Acide folique; Biotine; Vitamine B12; Antiagglomérant : Dioxyde de silicium, Sels de magnésium d'acides gras alimentaires; Colorants : Rouge de betterave, Concentré de carthame et de citron colorant, Isomalt; Agents d'enrobage : Hydroxypropylcellulose; Sirop de glucose; Amidon de riz; Acides gras alimentaires; Triglycérides à chaîne moyenne.

Les patient dialysés

Les patients dialysés peuvent régulièrement avoir besoin d'une supplémentation en vitamines hydrosolubles pour les raisons suivantes :

- Ils représentent souvent un apport réduit en vitamines hydrosolubles. Cela s'explique par des restrictions alimentaires liées au potassium (fruits, légumes), mais aussi par une perte importante de vitamines lors de la préparation des repas (par exemple en faisant tremper des aliments riches en potassium).
- De grandes quantités de vitamines hydrosolubles se perdent pendant le traitement de dialyse.
- Le besoin en vitamines augmente en raison d'un métabolisme en stress.

Conseils importants

A utiliser sous contrôle médical. Ne convient pas comme seule source d'alimentation.

Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose recommandée.

Si vous avez encore des questions sur l'utilisation de ce produit, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Date de la dernière révision de ce texte : Août 2024

Kuracilo bv
9070 Heusden
Belgique

Fabricant :
RenaCare NephroMed GmbH
35625 Hüttenberg
Allemagne

Renavit®

Gebrauchsinformation

Renavit® überzogene Tabletten

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, da sie wichtige Informationen über die Anwendung dieses Mittels enthält.

- Heben Sie diese Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Inhalt dieser Packungsbeilage:

1. Was ist Renavit® und wofür wird dieses Mittel angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Renavit® beachten?
3. Wie ist Renavit® anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Renavit® aufzubewahren?
6. Sonstige Informationen

1. WAS IST RENAVIT® UND WOFÜR WIRD DIESES MITTEL ANGEWENDET? Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)

Diätetisches Lebensmittel für die Behandlung eines Mangels an wasserlöslichen Vitaminen bei Dialyse-Patienten.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON RENAVIT® BEACHTEN?

Nehmen Sie Renavit® nicht ein, wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen einen der Inhaltsstoffe von Renavit® sind. (Siehe Liste der Inhaltsstoffe in Punkt 6. Sonstige Informationen)

3. WIE IST RENAVIT® ANZUWENDEN?

Dosierung

Befolgen Sie bei der Anwendung von Renavit® stets genau die Anweisungen Ihres Arztes. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Arzt oder Apotheker. Die übliche Dosis ist eine Tablette pro Tag. Schlucken Sie die ganze Tablette mit etwas Flüssigkeit (nicht kauen).

Wenn Sie mehr Renavit® eingenommen haben als empfohlen

Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie die Einnahme von Renavit® vergessen haben

Sie können die Dosis später am selben Tag einnehmen. Nehmen Sie keine doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorhergehende Einnahme vergessen haben.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Es sind im Allgemeinen keine unerwünschten Nebenwirkungen nach der Ein-

nahme von Renavit® bekannt. Falls Sie doch unerwünschte Nebenwirkungen feststellen, unterbrechen Sie die Einnahme der Tabletten und wenden sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

5. WIE IST RENAVIT® AUFZUBEWAHREN?

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren. An einer trockenen, vor Licht geschützten Stelle aufbewahren, wobei die Raumtemperatur (25 °C) nicht überschritten werden darf.

Renavit® nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums, das auf der Schachtel und auf der weißen Seite jeder Blisterverpackung mit Tabletten aufgedruckt ist, nicht mehr verwenden.

Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag dieses Monats.

6. SONSTIGE INFORMATIONEN

Der Inhalt von Renavit®

Menge Vitamine pro Tablette:

Vitamin C	120,0 mg
Thiamin	2,2 mg
Riboflavin	1,7 mg
Niacin	20,0 mg NE
Vitamin B6	10,0 mg
Folsäure	1000,0 µg
Vitamin B12	6,0 µg
Biotin	60,0 µg
Pantothensäure	7,5 mg

Inhaltsstoffe:

Vitamin C; Trennmittel: Talkum; Zucker; Stabilisator: Hydroxypropylmethylcellulose; Füllstoff: Cellulose; Nicotinamid; Vitamin B6; Stärke; Panthothensäure; Farbstoff: Calciumcarbonat; Palmkernfett ganz gehärtet; Stabilisator: Gummi arabicum; Thiamin; Riboflavin; Folsäure; Biotin; Vitamin B12; Trennmittel: Siliciumdioxid, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren; Farbstoffe: Beetenrot, färbendes Saflor- und Zitronenkonzentrat, Isomalt; Überzugsmittel: hydroxypropylcellulose; Glukosesirup; Reisstärke; Speisefettsäuren; mittelkettige Triglyceride.

Dialysepatienten

Dialysepatienten können aus folgenden Gründen regelmäßig eine Ergänzung von wasserlöslichen Vitaminen benötigen:

- Sie weisen häufig eine verminderte Zufuhr von wasserlöslichen Vitaminen auf. Gründe hierfür sind unter anderem auf Kalium bezogene Ernährungsbeschränkungen (Obst, Gemüse), aber auch ein schwerer Vitaminverlust bei der Zubereitung der Mahlzeiten (beispielsweise durch Einweichen von kaliumreichen Lebensmitteln).
- Während der Dialysebehandlung gehen große Mengen an wasserlöslichen Vitaminen verloren.
- Der Bedarf an Vitaminen nimmt in Folge eines stark belasteten Stoffwechsels zu.

Wichtige Empfehlung

Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nicht geeignet zur ausschließlichen Ernährung. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren. Die empfohlene Dosis nicht überschreiten.

Wenn Sie noch Fragen über die Verwendung dieses Produktes haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ihren Apotheker.

Datum der letzten Überarbeitung dieses Textes: August 2024

Kuracilo bv
9070 Heusden
Belgien

Hersteller:
RenaCare NephroMed GmbH
35625 Hüttenberg
Deutschland